

AVERTISSEMENTS AGRICOLES



STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORÊT
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 - BORGIO

Tél. 95.36.05.70



EDITION CORSE

Bulletin Technique N°
du 26 Mars 1990 167

VIGNE

** Oïdium

Dès que les cépages sensibles atteignent le stade 3,5 feuilles étalées, effectuez le traitement sans tarder (voir liste des produits jointe).

** Acarieus jaunes et rouges

Souvent abondants, ils ne nécessitent un traitement que si 70% des feuilles sont occupées.

Préférez les acaricides suivants:

- DANITOL	0,75 l/ha
- TALSTAR	0,25 l/ha
- NEORON	2 l/ha
- ARTABAN	2 l/ha
- PEROPAL	1,2 kg/ha
- ACAFOR	2 l/ha

** Noctuelles

Elles "broutent" l'extrémité des bourgeons. Les dégâts sont toujours localisés. N'intervenir que sur les pieds atteints avec par exemple:: FASTAC, BAYTHROID, CYMBUSH, DECIS, KARATE, SEMI - ALPHA.

.../...

P9

ARBRES FRUITIERS

**** Oïdium sur pêcher**

Sur variétés sensibles la production anti-oïdium doit débiter.
De nombreux produits sont utilisables.

**** Thrips sur nectarines**

Dans les parcelles où des attaques ont eu lieu l'an dernier, vérifiez à la loupe la présence de thrips. N'envisagez un traitement que dans ce cas là, car ce ravageur est peu présent. Préférez KLARTAN, AZOPHENE, ZOLONE, TAMARON, ORTHOTOX, ORTHENE.

**** Cochenilles du mûrier sur pêcher**

Les toutes premières sorties de larves de première génération sont visibles. Cet essaimage risque d'être étalé. Vous pouvez effectuer un premier traitement dès le début du mois d'avril avec :

methidathion	ULTRACIDE
quinalphos	EKALUX

:Attention: Ce ravageur est redoutable et de nombreux vergers bien infestés.

**** Tordeuse orientale du pêcher**

Les captures ont débuté de bonne heure. Elles sont parfois abondantes mais il est encore trop tôt pour traiter.

CULTURES MARAICHERES

**** Mildiou de la pomme de terre**

Pour les variétés précoces et semi-précoces à la veille de la floraison, pensez à protéger le feuillage contre le mildiou. Ce temps pluvieux est très favorable à la sortie de taches.

**** Bactériose de la tomate sous serre**

Les risques de développement de pseudomonas tomato sont de plus en plus fréquents. Un traitement peut être réalisé avec le mélange suivant :

sulfate de cuivre	300 à 400 g ma/hl	B. Bordelaise R.S.R
ou		
hydroxyde de cuivre	300 à 400 g ma/hl	CHAMPION FLO
+		
Mancozébe	200 g ma/hl	Nombreuses spécialités

: Tout plant atteint doit impérativement :
: être éliminé :

**** Cladosporiose de la tomate sous serre**

Elle peut être fréquente sous abri mal aéré. Elle se caractérise par des taches jaunes à la face supérieure des feuilles et une moisissure olivâtre à la face inférieure. Effectuez des pulvérisations à base de mancozébe, chlorothalonil ou triforine

=====

MATIERE ACTIVE			SPECIALITES COMMERCIALES				OBSERVATIONS
famille	nom	dose g/ha	nom	firmes	doses / ha	cout/ha F h.taxe	
LES SOUFRES							
soufre sublimé pour poudrage		20000 30000	FLUIDOSOUFRE	R.S.R	20à30 kg/ha	80,0 à 120,0	Le poudrage assure une très bonne pénétration à l'intérieur des souches
soufre trituré pour poudrage		30000 40000	NOMBREUSES SPECIALITES	/	30à40 kg/ha	83,0 à 110,0	action secondaire intéressante sur érinose et acariose.
soufre mouillables		10000	NOMBREUSES SPECIALITES	/	12,5 kg	85,0 à 125,0	A la cadence de 14 jours, respectez la dose de 12,5 kg/ha.
LES PRODUITS PENETRANTS (Inhibiteur de la Biosynthèse des Stérols I.B.S.)							
formamide	triforine *	285	SAPROL	Shell	1,5 L	107,4	Ces produits pénètrent à l'intérieur du feuillage, mais ne migrent que très localement, sans atteindre les organes formés après traitement.
pyridine	pyrifénos *	30 40	DORADO	La Quino	0,15 L 0,20 L	59,1 79,6	
pyrimidine	fénarimol	12 18	RUBIGAN 4	Dow Elanco	0,30 L 0,45 L	51,3 77,0	
	nuarimol	12 18	TRIMIDAL	Sandoz	0,10 L 0,15 L	61,2 91,9	S'utilisent à la cadence de 14 jours n'ont pas besoin d'être renouvelés après une pluie.
triazole	difénoconazole *	30	SCORE	C. Geigy	0,12 L	50,4	A partir de la floraison, traitez les rangs face par face en visant la zone fructifère afin de bien atteindre les grappes.
	diniconazole	16 24	SUMI-8	Rhodia	0,13 L 0,20 L	42,9 66,0	Utilisation exclusive d' I.B.S. à proscrire (risque d' apparition de résistances). A utiliser en alternance ou en association avec le soufre (ou dinocap...).
	flusilazol *	20 30	OLYMP 10 EC	Du Pont	0,20 L 0,30 L	50,1 75,1	
	hexaconazol *	15 20	ANVIL liq.	Sopra	0,30 L 0,40 L	55,1 73,5	Sur cépages sensibles (Carignan...) et/ou dans les parcelles attaquées l' année antérieure, utilisez obligatoirement la dose forte dès le début de la floraison et respectez une cadence maximum de 14 jours entre application
	myclobutanil *	20 30	SYSTHANE 12E	Procida	0,16 L 0,24 L	48,5 72,8	
	penconazole *	15 25	TOPAZE	C. Geigy	0,15 L 0,25 L	49,0 81,7	
	triadiméfon *	50 75	BAYLETON 5	Bayer	1,00kg 1,50kg	69,8 104,7	
	triadiménol *	25 38	BAYTAN 5 liq	Bayer	0,50 L 0,75 L	43,7 65,5	
ASSOCIATIONS SOUFRE - PRODUIT PENETRANT							
	soufre + dichlobutrazol	3000 + 38	FRIOL GRAPOL	R.S.R Prochim	5,00kg	75,0	poudre pour poudrage.
	soufre + fénarimol	6000 + 9	ISOCEL GD	Dow Elanco	7,50kg	112,5	
	soufre + myclobutanil	2800 + 21	THIOCUR F	R. & Haas	3,50kg	---	
	soufre + triadiménol	4000 + 25	MAC 2 VYNOC	R.S.R. Prochim	5,00kg	85,5	
	soufre + pyrifénos	15000 + 25	DORADO poudrage	La Quino	20,00kg	154,0	
ASSOCIATION DINOCAP - PRODUIT PENETRANT							
	dinocap + myclobutanil	975 22,5	SABITHANE	Schéring	0,3 L	83,2	Très bonne action secondaire sur P. Ulmi dans les essais SPV 1989
AUTRES FONGICIDES DE SYNTHESE							
dérivé du phénol	dinocap	210	KARATHANE liquide	Sandoz Rhodia	0,60 L	100,0	Produit très peu rémanent. Utilisation possible en applications curatives. Deux traitements espacés de 7 jours.
			KARATHANE	Pepro	1,15kg	82,2	
sulfamide	dichlofluanide	1250	EUPARENE	Bayer	2,50kg		

COÛT (hors taxes) / ha

D'après LE COÛT DES FOURNITURES EN VITICULTURE 1990, H. Marcelin & L. Fleck, ITV, SUAD
Ces coûts ne sont qu'indicatifs. Ils ne doivent être utilisés qu'à titre de comparaison. Il est normal qu'ils ne correspondent pas exactement à ceux que vous pourrez rencontrer chez votre fournisseur.

Les produits mixtes anti Oïdium-anti mildiou ne figurent pas dans ce tableau.
*: matières actives également homologuées seules ou en association contre le Black-rot.

P10